



Министарство пољопривреде
трговине, шумарства и водопривреде
Управа за ветерину



Пројекат финансира ЕУ

ОРАЛНА ВАКЦИНАЦИЈА ЛИСИЦА И ДРУГИХ ДИВЉИХ МЕСОЈЕДА ПРОТИВ БЕСНИЛА



Беснило је смртоносно обољење централног нервног система код животиња и људи.

Извор заразе вируса беснила је плувачка бесне животиње, за људе је у 90% случајева то угриз бесног пса.

Годишње у свету од беснила умре више од 50.000 људи и деце. Резервоар вируса беснила у природи су: заражене лисице, вукови, шакали, дивље свиње, веверице, мишеви и слепи мишеви, а од домаћих животиња пси и мачке.

ВАКЦИНИШИТЕ СВОГ ПСА И МАЧКУ СВАКЕ ГОДИНЕ!

Више података о беснилу и оралној вакцинацији можете добити код свог ветеринара, у ветеринарским институтима и на сајту Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде

<http://www.minpolj.gov.rs>
<http://www.vet.minpolj.gov.rs>

Беснило се код дивљих животиња успешно сузбија континуираном вишегодишњом оралном вакцинацијом која се спроводи у пролеће и у јесен

Прва орална вакцинација дивљих животиња у Србији спроведена је у новембру 2010. године.

Друга орална вакцинација спроводиће се у Србији током маја 2011. године.



Дистрибуција оралних вакцина против беснила врши се избацавањем мамака вакцине из малих авиона.

Мамак вакцине састоји се од ампуле, у којој је смештена вакцина и хранљивог дела, који је тамнобраон боје, снажног мириса да би привукао лисице и друге дивље месоједе.

Вакцине су регистроване у Србији и задовољиле су све захтеве у погледу квалитета, безбедности, ефикасности и стабилности



ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ

- Не додирујте мамке са вакцином, јер су они намењени лисицама. Објасните то и својој деци.
- Уколико у свом дворишту или башти пронађете мамак вакцине за дивље животиње, ставите рукавицу или пластичну кесу на руку и баците мамак у оближњу шуму
- Уколико сте додиривали хранљиви део мамка вакцине незаштићеном руком, оперите руке детерџентом и водом
- Уколико сте додиривали унутрашњост вакцине, оперите руке детерџентом и водом и обратите се свом лекару или најближој антирабичној станици
- Уколико је Ваш пас, мачка или нека друга домаћа животиња појела вакцину, обавестите о томе свог ветеринара
- Две недеље након вакцинације, псе и мачке држите затворене или везане и немојте им дозвољавати, као ни другим домаћим животињама, да буду у зони вакцинације

Техничка подршка за контролу и искорењивање класичне куге свиња и беснила у Србији